



BONITO®

FUNGICIDA SISTÉMICO

FUNGICIDA SISTÉMICO DE AMPLIO ESPECTRO,
CON EFECTO PREVENTIVO, CURATIVO
Y ERRADICANTE

MATERIA ACTIVA

Tebuconazol

FORMULACIÓN

Tebuconazol, 25%
p/v (250 g/l), en forma de
concentrado emulsionable (EC)

Nº REGISTRO

24.814

Taraactive®

BONITO[®]

FUNGICIDA SISTÉMICO

BONITO[®] es un fungicida sistémico de amplio espectro con efecto preventivo, curativo y erradicante. Se caracteriza por su alta eficacia en el control de hongos causantes de enfermedades como oidios, brotritis, royas, moteados, monilia y otros.

APLICACIONES AUTORIZADAS, MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Nº aplicaciones (intervalo mínimo)	Volumen caldo (l/ha)	P.S. (días)	Forma y época de aplicación (Condic. Específica)
Manzano	Oídio y moteado	0,06 – 0,09% (60-90 ml/100 litros agua) (máx. 1 l/ha a partir formación de frutos máx. 0,8 l/ha)	1	-	7	Aplicaren primavera o comienzos verano
Peral	Oídio, moteado y stemphylium	0,06 – 0,09% (60-90 ml/100 litros agua) (máx. 1 l/ha, a partir formación de frutos máx. 0,8 l/ha)	1	-	7	Aplicaren primavera o comienzos verano
Melocotonero, nectarino y albaricoquero	Oídio y monilia	0,06 – 0,1% (60-100 ml/100 litros agua) (máx. 1 l/ha, a partir formación de frutos máx. 0,8 l/ha)	1	-	7	Aplicaren primavera o comienzos verano.
Olivo	Repilo	0,06% (60 ml/100 litros agua) (máx. 0,48 l/ha)	1	-	NP	No aplicar hasta finales de invierno o primavera antes de la floración
Vid	Oídio y botritis	0,04 – 0,1% (40-100 ml/100 litros agua) (máx. 0,4 l/ha)	3 (14 días)	-	14	-
Tomate	Botritis, cladosporiosis y esclerotinia	0,04-0,1% (40-100 ml/100 litros agua)	3 (7 días)	500-1000	3	-
Berenjena	Botritis, cladosporiosis, esclerotinia y roya	0,04-0,1% (40-100 ml/100 litros agua)	3 (7 días)	500-1000	3	-
Pepino y calabacín	Botritis, cladosporiosis y esclerotinia	0,04 – 0,1% (40-100 ml/100 litros agua) (máx. 0,5 l/ha)	3 (7 días)	-	3	-
	Oídio	0,05% (50 ml/100 litros agua) (máx. 0,5 l/ha)				
Melón, sandía y calabaza	Botritis, cladosporiosis y esclerotinia	0,04 – 0,1% (40-100 ml/100 litros agua) (máx. 0,5 l/ha)	3 (7 días)	-	7	-
	Oídio	0,05% (50 ml/100 litros agua) (máx. 0,5 l/ha)				
Trigo y cebada	Oídio, roya, septoria y helmintosporium	1 l/ha	2 (15 días)	200-400	35	-
Triticale	Septoriosis	1 l/ha	1	200-400	35	-
Avena y centeno	Helmintosporium, oídio, roya y septoria	1 l/ha	2 (21 días)	100-500	35	Aplicar en fin de floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas

P.S. - Plazo de seguridad; NP - No procede

Aplicar al aire libre mediante pulverización normal con tractor dirigida al suelo, excepto en olivo que será dirigida hacia arriba.

MODO Y DOSIS DE EMPLEO

BONITO[®] en estrategia con otros fungicidas de acción y espectro complementario con la finalidad de evitar la aparición de resistencias que pudieran reducir la eficacia del producto. BONITO[®] es activo sobre diversas royas de los géneros Puccinia y Uromyces.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.) La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

ENVASES DISPONIBLES



1l



5l

COMPATIBILIDAD

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.



ANTONIO TARAZONA, S.L.U.

Av. Espioca 50-52 | 46460 SILLA | Valencia | España

Tel. 96 120 37 38 | Fax 96 120 27 39

www.antoniotarazona.com



NOTA: La información contenida en este folleto no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.