



# NIORD<sup>®</sup>

INSECTICIDA  
GRANULADO [GR]

MATERIA ACTIVA

Teflutrin

FORMULACIÓN

Teflutrin 5 g/kg (0,5% p/p)

Nº REGISTRO

17.502

**Tara**active<sup>®</sup>

# NIORD<sup>®</sup>

## INSECTICIDA

NIORD<sup>®</sup> es un insecticida que funciona por contacto, ingestión y de aplicación al suelo.

### APLICACIONES AUTORIZADAS, MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Plaga	Cultivo	Momento aplicación	Dosis	Nº Aplic. (intervalo)	PS (días)
Para el control de insectos del suelo ("gusanos del alambre" ( <i>Agriotes spp.</i> ), "gusanos grises" ( <i>Agrotis spp.</i> ), "pulguilla" ( <i>Chaetocnema tibialis</i> ), "falsa potra" ( <i>Ceuthorrhynchus pleurostigma</i> ), "mosca de la cebolla, de los sembrados y de la col" ( <i>Delia spp.</i> ), "mosca de la zanahoria" ( <i>Psila rosae</i> ), "típula" ( <i>Tipula spp.</i> ), "gusano blanco" ( <i>Melolontha melolonta</i> ), "milpiés" y "ciempiés")	Algodonero, girasol, guisantes, hortalizas del género Brassica (brócoli, coliflor, coles de Bruselas, repollo, col china y colirrábano), judías verdes, maíz (también maíz dulce), nabo, rábano, tabaco, tomate y zanahoria	Aplicar antes o durante la siembra	10-15 kg/ha	1	NP
	Apio, berenjena, colinabo, lechugas y similares	Aplicar antes o durante la siembra	15-20 kg/ha	1	NP
	Hinojo	Aplicar durante la siembra	15-20 kg/ha	1	NP
	Melón y sandía	Aplicar antes o durante la siembra	15 kg/ha	1	NP
Para el control de insectos del suelo ("gusanos del alambre" ( <i>Agriotes spp.</i> ), "gusanos grises" ( <i>Agrotis spp.</i> ), "pulguilla" ( <i>Chaetocnema tibialis</i> ) y "mosca de la cebolla, de los sembrados y de la col" ( <i>Delia spp.</i> ))	Soja	Aplicar durante la siembra	12-15 kg/ha	1	NP
Para el control de insectos del suelo ("gusanos del alambre" ( <i>Agriotes spp.</i> ), "gusanos grises" ( <i>Agrotis spp.</i> ), "diabrotica" ( <i>Diabrotica spp.</i> ), "escutigera" ( <i>Scutigerella immaculata</i> ), "típula" ( <i>Tipula spp.</i> ) y "mosca de la cebolla, de los sembrados y de la col" ( <i>Delia spp.</i> ))	Sorgo	Aplicar durante la siembra	12-15 kg/ha	1	NP
Para el control de insectos del suelo ("pulguilla" ( <i>Chaetocnema tibialis</i> ) y "maripaca" ( <i>Aubeonymus mariaefranciscasae</i> ).	Remolacha azucarera	Aplicar antes o durante la siembra	10-15 kg/ha (para el control de pulguilla) o 20 kg/ha (para el control de maripaca)	1	NP

PS – Plazo seguridad. NP – No procede

### MODO Y DOSIS DE EMPLEO

NIORD<sup>®</sup> debe emplearse aplicándolo directamente al suelo, bien antes o durante el momento de la siembra. Aplicar NIORD<sup>®</sup> enterrado en el interior del surco, rodeando las semillas a proteger.

Aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor. No aplicar en superficie, el producto solamente podrá ser aplicado enterrado en el suelo. No aplicar el producto con existencia de viento en la zona para evitar riesgo en abejas.

### ENVASES DISPONIBLES



10 Kg

### COMPATIBILIDAD

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.



ANTONIO TARAZONA, S.L.U.  
Av. Espioca 50-52 | 46460 SILLA | Valencia | España  
Tel. 96 120 37 38 | info@antoniotarazona.com  
www.antoniotarazona.com



NOTA: La información contenida en este folleto no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.