



TRIBILO CU[®]

FUNGICIDA

FUNGICIDA Y BACTERIZIDA PREVENTIVO
DE CONTACTO DE AMPLIO ASPECTRO

MATERIA ACTIVA

Cobre

FORMULACIÓN

Oxícloruros de cobre, 38%
p/v (380 g/l), en forma de
suspensión concentrada (SC)

Nº REGISTRO

16.395

Taraactive[®]

TRIBILO CU®

FUNGICIDA

TRIBILO CU® es un fungicida clásico, preparado con la más moderna tecnología para conseguir un producto con mayor número de partículas, más adherentes y resistentes al lavado, de mayor facilidad de empleo, con menos peligrosidad para el usuario, con excelente suspensibilidad y miscibilidad con otros preparados líquidos y, por todo ello, con mayor eficacia, rapidez de acción y más fácil empleo.

APLICACIONES AUTORIZADAS, MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad / hongo	Dosis (%)	Nº Aplic. (Intervalos)	Vol. Caldo (l/ha)	Plazo de seguridad (días)
CÍTRICOS	Aguado y bacteriosis	0,1-0,25	1-5 (13 días)	1000-2000	14
ALMENDRO	Abolladura, bacteriosis, cribado y monilia	0,3-0,4	1-4 (7 días)	500-870	NP
AVELLANO	Bacteriosis	0,3-0,4	1-4 (7 días)	500-870	NP
PISTACHO	Bacteriosis y alternaria	0,3-0,4	1-4 (7 días)	500-870	NP
NOGAL	Bacteriosis	0,3-0,4	1-4 (7 días)	500-870	NP
FRUTALES DE HUESO	Monilia, cribado, abolladura y bacteriosis	0,2-0,6	1-4 (13 días)	400-1000	NP
FRUTALES DE PEPITA	Bacteriosis, monilia y moteado	0,2-0,5	1-4 (7 días)	500-1000	NP
FRESAL (aire libre e invernadero)	Antracnosis	0,2-0,4	1-4 (7 días)	500-1000	7
OLIVO	Repilo y tuberculosis	0,2-0,4	1-4 (13 días)	600-1000	14
PATATA	Alternaria y mildiu	0,2-0,6	1-5 (7 días)	400-1000	14
	Antracnosis			400-750	
BULBOS DE HORTÍCOLAS (ajo, cebolla y chalote)	Mildiu, alternaria, antracnosis y bacteriosis	0,2-0,6	1-4 (7 días)	400-1000	3
TOMATE y BERENJENA (aire libre e invernadero)	Mildiu, alternaria, antracnosis y bacteriosis	0,2-0,6	1-5 (7 días)	400-1000	10 (*)
CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE (aire libre e invernadero)	Mildiu, alternaria, antracnosis y bacteriosis	0,2-0,3	1-4 (7 días)	660-1000	3
CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE (aire libre e invernadero)	Mildiu, alternaria, antracnosis y bacteriosis	0,2-0,5	1-5 (7 días)	400-1000	7
HORTALIZAS DEL GÉNERO BRASSICA (coliflor y brécol)	Alternaria, antracnosis, bacteriosis y mildiu	0,2-0,4	1-4 (7 días)	500-1000	14
LECHUGAS Y SIMILARES (aire libre e invernadero)	Alternaria, antracnosis, bacteriosis y mildiu	0,2-0,3	1-4 (7 días)	660-1000	7
LEGUMINOSAS VERDES (frescas) (judías, lentejas, habas y guisantes)	Antracnosis, bacteriosis y mildiu	0,2-0,3	1-4 (7 días)	660-1000	3
TALLOS JÓVENES (puerro y alcachofa)	Alternaria, bacteriosis, mildiu y ascocytosis	0,2-0,3	1-5 (7 días)	660-1000	7
ORNAMENTALES HERBÁCEAS (aire libre e invernadero)	Mildiu	0,2-0,3	1-3 (7 días)	400-1000	NP
ORNAMENTALES LEÑOSAS (aire libre e invernadero)	Mildiu	0,2-0,3	1-3 (7 días)	400-1000	NP
	Roya	0,3-0,4	(7 días)	500-880	

Frutales de hueso, Frutales de pepita, Nogal, Almendro, Avellano y Pistacho: Aplicar en prefloración. Dosis 1,97-2,6 l/ha.

Tomate y Berenjena: Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta madurez completa (BBCH 15-89). Aplicar con una dosis de 1,97-2,6 l/ha. En invernadero, cuando la aplicación sea manual con lanza o mochila, no superar los 2,2 l/ha por aplicación.

Bulbos de horticolas: Aplicar desde que la 4ª hoja es claramente visible hasta que en el 10% de las plantas, las hojas están inclinadas o hasta que se alcanza el 70% de la longitud y el diámetro del bulbo o fuste esperado (BBCH 14-47) respetando una dosis de 1,97-2,1 l/ha.

Cítricos: Aplicar desde que se hacen visibles varias hojas, pero sin alcanzar el tamaño final hasta que el fruto está maduro y apto para el consumo (BBCH 15-89). Dosis de aplicación 1,97-2,6 l/ha con un máximo de 10,52 l/ha y año.

Cucurbitáceas de piel comestible y de piel no comestible: Aplicar desde que los cotiledones están completamente desplegados hasta la madurez completa (BBCH 10-89). Dosis de aplicación 1,97-2,1 l/ha.

Fresal: Aplicar desde que hay 3 hojas desplegadas hasta que los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico (BBCH 13-85), respetando una dosis de 1,97-2,1 l/ha.

Hortalizas del género Brassica: Aplicar desde que la 4ª hoja está desplegada hasta que los primeros pétalos florales son visibles (BBCH 14-59). Aplicar con una dosis de producto de 1,97-2,1 l/ha.

Lechugas y similares: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que se alcanza la altura típica (BBCH 12-49) respetando una dosis de 1,97-2,1 l/ha.

Leguminosas verdes (frescas): Aplicar desde que hay 4 hojas desplegadas hasta madurez completa (BBCH 14-89) respetando una dosis de 1,97-2,1 l/ha.

Olivo: Aplicar desde que comienza el desarrollo de las hojas hasta que aumenta la coloración específica de los frutos (BBCH 10-85). Dosis 1,97- 2,63 l/ha.

Ornamentales herbáceas y leñosas: Aplicar en cualquier etapa de desarrollo del cultivo. Dosis 1,97-2,6 l/ha excepto en aplicaciones con mochila/lanza en invernadero donde no se excederán los 2,2 l/ha.

Patata: Aplicar desde que la 5ª hoja del tallo principal está desplegada, hasta que las bayas de fructificación de primer grado son de color ocre o amarillentas (BBCH 15-85) con una dosis de 1,97-2,6 l/ha.

Tallos jóvenes: Aplicar desde que la 4ª hoja es claramente visible hasta que el bulbo empieza a alargarse o los órganos florales son visibles (BBCH 14-51) respetando una dosis de 1,97-2,1 l/ha.

MODO Y DOSIS DE EMPLEO

TRIBILO CU® es un fungicida y bactericida preventivo de contacto de amplio espectro.

Para uso profesional, en cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o bien manual con mochila o lanza/pistola. En cultivos- en invernadero, aplicar mediante pulverización manual con mochila o lanza/pistola, carretilla o instalaciones fijas automatizadas.

ENVASES DISPONIBLES



5l

COMPATIBILIDAD

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.



ANTONIO TARAZONA, S.L.U.
Av. Espioca 50-52 | 46460 SILLA | Valencia | España
Tel. 96 120 37 38 | Fax 96 120 27 39
www.antoniotarazona.com



NOTA: La información contenida en este folleto no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.